

Aus der Universitätsfrauenklinik München.
(Vorstand: Geheimrat Prof. Dr. Döderlein.)

Ueber einen Fall von Darmperforation
durch *Ascaris lumbricoides*
mit nachfolgender Peritonitis nach
Kaiserschnitt beobachtet.

Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde
in der gesamten Medizin

verfaßt und einer

Hohen medizinischen Fakultät

der

Bayr. Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von

Hans Reinecke

aus

Gardelegen.

Thema: Prof. Dr. E. Zweifel
Referat: Geh. Prof. Dr. A. Döderlein



Meinen Eltern.

Angesichts der Häufigkeit seines Vorkommens und seiner allgemeinen Verbreitung bei fast allen Menschenrassen ist man leicht geneigt, den *Ascaris lumbricoides* als einen harmlosen Darmschmarotzer anzusehen. Ueberblickt man jedoch die Fälle in der Literatur über die Krankheitszustände und die lokalen Schädigungen, die durch den Spulwurm bewirkt werden können, so ist man gezwungen, ihn zu den ernststen, ja lebensbedrohlichen Krankheitserregern zu rechnen. So verursacht der oft kaum bemerkte Darmparasit eine Reihe von Krankheitserscheinungen, die schon mechanisch durch seine beträchtliche Größe und äußerst kräftige Muskulatur, ferner durch seinen ausgesprochenen Wandertrieb mit oft nachfolgenden Sekundärinfektionen, und schließlich auch durch von ihm erzeugte Gifte am Orte seines Sitzes, dem Dünndarm, und fern von diesem hervorgerufen werden.

Hauptsächlich die letzten Jahre haben uns eine genaue Kenntnis über die Schädigungen durch den Spulwurm gebracht, seitdem man die genaue Entwicklung des *Ascaris* erkannt und seine mechanischen und chemischen Einwirkungen auf den Organismus des Wurmträgers experimentell erforscht hat. Auch klinische und therapeutische Arbeiten haben unsere Erkenntnis über das Wesen der Ascariserkrankungen in großem Maße gefördert.

Die uns geläufigen Erscheinungen der Ascaridiasis werden erst durch den Parasitismus der heranwachsenden und geschlechtsreifen Tiere im Darm hervorgerufen, während die physiologische Wanderung der *Ascaris*embryonen mit ihrer Fieber- und Lungenerscheinung kaum je als eine Ascariserkrankung angesehen wird.

Ueber das Vorhandensein des reifen Spulwurms in den verschiedensten Organen gibt uns die Literatur die beste Auskunft. So hat man Ascariden im Magen, in der Speiseröhre, im Rachen, in der Luftröhre, in den Bronchien, in der Nase und ihren Nebenhöhlen und

auch sogar im Ohr beobachtet. Bei Frauen sind Ascariden in der Vulva, Vagina, Uterus, Tube, Blase und auch in der freien Bauchhöhle beschrieben worden. Von großer Bedeutung ist jedoch auch das Einwandern der Spulwürmer in den Appendix, in den Ductus choledochus und cysticus, in die Gallenblase, den Ductus hepaticus und in die Lebergallengänge und schließlich auch in den Ductus pancreaticus. Auch in der freien Bauchhöhle, in Abscessen der Bauchwand hat man den Spulwurm angetroffen. Meist sind die Würmer durch ein vorbereitetes oder bereits bestehendes Loch dorthin gelangt.

Das bekannteste Ereignis, das den oft bis dahin unbemerkten Darmschmarotzer erkenntlich werden läßt, ist wohl der Ascaridenileus. Im Verhältnis zu dem sehr häufigen Vorkommen der Spulwürmer ist der Ileus verminosus selten, am seltensten jedoch wohl durch Invagination oder Volvulus. Beim Wurmileus handelt es sich um eine Kombination von Obturations- und spastischem Ileus, wobei mechanische und toxische Einflüsse eine große Rolle spielen.

Solange man sich mit den Eingeweidewürmern beschäftigt hat, ist wohl die wichtigste Frage vom klinischen Standpunkte aus die gewesen: „Wie gelangt der Ascaris in die freie Bauchhöhle, und ist er überhaupt in der Lage, die Darmwand zu durchbohren?“ Obgleich nach dieser Richtung hin die genauesten Untersuchungen vorgenommen wurden, so ist es doch bis heute noch nicht gelungen, zu einem einwandfreien Resultat zu gelangen.

Vor Mitteilung eines neuen Falles, der zur Klärung dieser Frage beitragen dürfte, ist es daher wohl gerechtfertigt, an Hand der Literatur die Schädigungen durch Ascariden und ihr Zustandekommen zusammenzufassen und näher zu betrachten.

Es ist dem Verdienst von Flury, der umfassende chemische Analysen der Körperflüssigkeiten und der normalen Stoffwechselprodukte dieser Darmschmarotzer angestellt hat, zuzurechnen, daß wir über diese Fragen näher orientiert sind. Bei diesen Untersuchungen hat sich herausgestellt, daß durch die Exkrete, durch entstehende Zersetzungsprodukte bei Fäulnis abgestorbener Würmer, durch spezifische Gifte, die sich durch ihren eigenartigen, beißenden Geruch bemerkbar machen, sowie durch flüchtige Stoffe der Ascariden eine starke Gift-

wirkung auf den Organismus des Wurmträgers ausgeübt wird.

Mehrere Substanzen vermögen in vielfacher Art und Weise chemisch auf den Körper des Wirtes einzuwirken. So besitzen die flüchtigen Fettsäuren und ihre Ester und Aldehyde, die sich unter den Destillationsprodukten der Ascariden und ihrer Ausscheidungsprodukte finden, eine lokal intensiv reizende Wirkung, die sich in Form von Hyperämie, Entzündung und Nekrose bemerkbar macht. Auch die entfernteren Glieder der Fettsäurereihe zeichnen sich noch in starken Verdünnungen durch Auslösung starker Reiz- und Aetzwirkungen aus. Diesen Stoffen vor allem müssen die heftigen Reizungssymptome der Schleimhäute und die eigentümlichen Ueberempfindlichkeitserrscheinungen zugeschrieben werden, die sich beim Arbeiten mit Ascariden bemerkbar machen.

Die verschiedensten subjektiven Beschwerden der Parasitenträger wie Uebelkeit, Erbrechen, Aufstoßen, Leibschmerzen, Koliken, Appetitmangel, blutige Durchfälle, Inanition und Anämien sind auf die Resorptionswirkung der Giftstoffe der Spülwürmer, die vom Wurm vorwiegend intra vitam gebildet werden, zurückzuführen. Auch nervöse Erscheinungen wie Mydriasis, Strabismus, Delirien, Halluzinationen und Krämpfe beruhen auf dieser Grundlage.

Neben diesen Wirkungen ist auch noch das in der Leibeshöhlenflüssigkeit der Ascariden enthaltene Kapillargift in Betracht zu ziehen. Besonders in den Fällen, wo es sich um rein blutige Stühle, wie sie Cohnreich beschrieben hat, handelt, ist neben der Aetzwirkung noch an eine Vergiftung der Darmkapillaren nach Resorption dieses Giftes der Leibeshöhlenflüssigkeit zu denken. Diese sehr wirksame Substanz gelangt nach Verletzung der Würmer untereinander durch primär durch Aetzwirkung beschädigte Stellen der Schleimhaut direkt in die Blutbahn und führt so zu den schweren Vergiftungserrscheinungen und zu den Veränderungen der kleinsten Darmgefäße. Als Folgen dieser Giftwirkung sind chronische Vergiftung, Gewöhnung und Anaphylaxie bemerkenswert.

Für die Beurteilung der Beziehungen zwischen Ascarisgiften und deren Symptome ist die Angabe Cohnreichs und anderer Autoren bemerkenswert, daß alle diese zum Teil schweren Erscheinungen mit dem Abtreiben der Würmer durch eine Santonin-Calomelkur sofort und dauernd verschwinden.

Ueber die Einflüsse dieser Stoffwechselprodukte und der aus den Spulwürmern gewonnenen Extrakte auf den Darmtonus hat R o s t durch seine experimentellen Untersuchungen am Katzendarm Klarheit geschaffen. Er stellte dabei fest, daß die Stoffwechselprodukte der Ascariden eine Herabsetzung des Darmtonus ergaben, wie man es bei der Wirkung des Adrenalins gewohnt ist, während die Extrakte der Würmer eine Steigerung im Darmtonus hervorriefen, also den Darm zu spastischen Kontraktionen brachten. Die Leibeshöhlenflüssigkeit, die, wie Flury ausdrücklich betont, starke Reizungen der Darmmucosa hervorruft, hat auf den Tonus überhaupt keinen Einfluß.

Auf Grund dieser Beobachtungen läßt sich also das Bild des Ileus verminosus klar überblicken. Die relative Seltenheit des spastischen Ileus durch Ascariden ist also durch die Tatsache zu erklären, daß nur die inneren Organe der Spulwürmer für diese Symptome angeschuldigt werden können. Aber auch die Komponente der Ascaridenstoffwechselprodukte ist nicht ganz außer Acht zu lassen, da durch sie das Zustandekommen der Ascaridenknäuel, die den Darm obturieren, eine hinreichende Erklärung findet, denn ohne die Annahme einer Störung der Darmfunktion ist eine derartige Wurmanhäufung kaum denkbar.

Wie stark derartige durch die Ascariden hervorgerufenen Spasmen sein können, und zu welchen Verwechselungen sie Anlaß geben können, davon legt der von K a r t a l beobachtete Fall beredtes Zeugnis ab.

Bei einem durch Unfall verletzten achtjährigen Knaben fanden sich schwere Darmspasmen in mehreren Dünndarmschlingen um Ascariden herum, welche eine intraperitoneale Blutung vortäuschten. Erst die Laparotomie klärte die Sachlage auf.

Auch peritonitische Krankheitserrscheinungen, die lediglich eine peritoneale Entzündung infolge Anwesenheit von Ascariden im geschlossenen Darme darstellen, sind beobachtet worden. So berichtet S c h l o e ß m a n n einen hierhergehörigen Fall eines 20jährigen Mädchens.

Die Wahrscheinlichkeitsdiagnose vor der Operation war Peritonitis nach Appendicitis. Bei der Laparotomie erwies sich der Wurmfortsatz als völlig gesund. Am Dünndarm Injektion der Serosa, im Darme selbst massenhaft Ascariden. Nach Austupfen des Exsudates und

Schluß der Bauchhöhle Santoninkur. Nach Abgang von 117 Würmern trat Heilung ein.

Auch Simon beschreibt einen Fall bei einem Kinde, wo nach Ausstoßung eines Paketes lebender Ascariden die peritonitischen Erscheinungen, Ohnmachtsanfälle und rein blutige Stühle verschwanden.

Gleichfalls peritonitische Reizungen werden auch von Cohnreich und im Lehrbuch von Braun-Seiffert angegeben.

Bei dem Fall von Cohnreich handelte es sich um einen Landwirt, der mit der Diagnose einer Blinddarm-entzündung ins Spital eingewiesen wurde. Es bestanden peritonitische Reizerscheinungen, kleiner frequenter Puls und Temperatur von 39° . Da keinerlei besondere Schmerzempfindlichkeit am Mac-Burney'schen Punkte bestand und im Stuhl massenhaft Ascariseier gefunden wurden, so wurde nur eine Santonin-Calomelkur vorgenommen. Nach Abgang von 40 Ascariden gingen die sämtlichen Erscheinungen zurück, und der Patient war auch sofort fieberfrei.

Daß Spulwürmer eine lokale Peritonitis hervorrufen und klinisch die Symptome einer Appendicitis vortäuschen können, dazu liefert Huber einen weiteren Beweis.

Ein 13jähriger Knabe wurde wegen Appendicitis simplex operiert. Die Laparotomie ergab eine normale Appendix. 8 bis 10 cm oberhalb der Valvula Bauhini zeigte das Ileum auf einer Strecke von 20 cm Rötung und stark erweiterte Lymphgänge des Serosaüberzuges; die zugehörigen mesenterialen Lymphdrüsen waren geschwollen. Der krankhaft veränderte Darmteil enthielt zahlreiche Spulwürmer. Huber führt die Veränderung der Darmwand auf die chemischen Produkte der Parasiten zurück.

Als Zeichen starker Giftresorption sind auch die geschwollenen Drüsen des Mesenteriums anzusehen, über die Strater bei einem Fall von Ascaridenileus berichtet.

Wenn uns diese Untersuchungen über die Ascariden auch schon viel weiter gebracht haben, so fehlen uns doch noch vollständig einwandfreie experimentelle Beobachtungen, die eine Perforation des gesunden Darmes durch die Ascariden erkennen lassen. Dies ist wohl auch die grundlegende Ursache dafür, daß die Durchbohrung der gesunden Darmwand durch den Wurm

fast übereinstimmend verneint wird. Daß dagegen eine Läsion, eine Benagung des Darmes durch die Spulwürmer vorkommt, stellt A s c h o f f außer Zweifel. Bei denjenigen Fällen jedoch, wo eine Perforation des Darmes und eine Anwesenheit von Würmern im Darne und in der Peritonealhöhle festgestellt wurde, entscheidet er in dem Sinne, daß die Ascariden erst nachträglich in die Bauchhöhle ausgekrochen seien. In den vereinzeltten Fällen dagegen, wo der Gedanke einer Darmdurchbohrung durch einen Ascaris nicht ausgeschlossen erscheint, glaubt er an eine Enteritis mit katarrhalischen Geschwüren, die durch die Ascariden erzeugt war.

Die häufigste Ursache des Eindringens der Spulwürmer in die freie Bauchhöhle ist wohl die, daß die Spulwürmer infolge ihres Wandertriebes und ihrer Eigentümlichkeit, gern in enge Kanäle zu kriechen, durch eine bereits bestehende Oeffnung des Darmes hindurchschlüpfen. Am häufigsten tritt dies wohl bei bereits bestehenden Ulcerationen auf, so bei tuberkulösen Darmgeschwüren, aber auch Typhusgeschwüre, Perforationsstellen des Wurmfortsatzes etc. werden von den Tieren als Passagestellen benutzt.

So berichtet z. B. C a p i t o l i n über zwei von ihm behandelte Fälle, wo Ascariden durch tuberkulöse Darmgeschwüre und durch die Perforationsstelle des Appendix ausgewandert waren. Sie hatten dann eitrige Peritonitiden hervorgerufen, und als man hier incidierte, entleerten sich Ascariden aus der Wunde.

Beim ersten, 22 Jahre alten Kranken war die Ansammlung in der rechten Flanke und subumbilikal mit peritonitischen Erscheinungen. Er starb an Kachexie, und bei der Autopsie fand sich eine caseöse Tuberkulose mit eitrig exsudativen und fibrinösen peritonitischen Verwachsungen und eine Dünndarmschlinge perforiert und mit dem Abscesse in Zusammenhang.

Im zweiten Falle entwickelte sich die Krankheit als eitrige Appendicitis mit Eiteransammlung in der Fossa iliaca; beim Schnitt entleerte sich nach dem Eiter ein olivengroßer Kotstein und in 3—4 Paketen in 5 Tagen ca. 30 Ascariden. Capitolin erinnert dabei noch an einen Fall, der an Peritonitis generalis erlag, und wo bei der Autopsie sich eine Dünndarmperforation mit einem lebendigen Ascaris fand.

Auch S c h l o e s m a n n berichtet über 6 Fälle von Auswanderung von Ascariden aus dem perforierten

Wurmfortsatz, die er an der chirurgischen Klinik zu Tübingen innerhalb von 2 Jahren gesehen hat. Er hebt dabei noch besonders hervor, daß selbst in ascaridenreicher Gegend der Befund ausgewanderter Würmer in 3% der Fälle von Perforationsappendicitis doch zu denken geben kann, zumal wenn man bedenkt, daß der Spulwurm normalerweise ja nicht das Coecum besiedelt, sondern nur ausnahmsweise unter pathologischen Bedingungen dorthin gelangt.

Durchwanderungen von Ascariden durch die Darmwand sind mehrfach beschrieben worden, wobei es sich um die Perforation einer pathologisch veränderten Wand handelte. So berichtet Jaroschka über einen Fall von Dünndarmperforation durch Ascariden an einer Serosanahtstelle bei einem Fall von Ascaridenobstructionsileus.

Es handelte sich um einen 1 $\frac{1}{4}$ jährigen Knaben, der plötzlich unter ileusartigen Erscheinungen erkrankte. Es wurde zunächst eine Darminvagination angenommen, bis sich bei der Operation herausstellte, daß das unterste Ileum durch ein Wurmknäuel obturiert war. Man versuchte zunächst das Wurmknäuel in den Dickdarm einzuschieben. Da dieser Versuch mißlang, eröffnete man den Darm und entfernte 100 Ascariden. Bei der Vorlagerung der äußerst geblähten Ileumschlingen riß an einer Stelle die Serosa des Darmes, während Muscularis und Mucosa intakt blieben. Nach 2 Tagen traten plötzlich Erscheinungen einer diffusen Peritonitis, die zum Tode führte, auf. Bei der Autopsie stellte sich dann heraus, daß an der Nahtstelle des Serosarisses der Darm von 2 Ascariden perforiert war, während ein dritter unterhalb eines Catgutfadens lag. Außerdem fanden sich im Darm noch 150 Ascariden zu dicken Convoluten zusammengeballt.

Einen ähnlichen Fall, wo es sich gleichfalls um einen Obturationsileus mit mehrfacher sekundärer Darmperforation handelte, hat Amberger beschrieben. Hier war es ein 17jähriger Mann, der akut erkrankte und als Appendicitis operiert wurde. Nach Entfernung von 129 Ascariden aus dem untersten Ileum Darmnaht in 3 Schichten. Sekundär auftretende Abscedierung und mehrfache Darmperforation an und neben der Nahtstelle mit Austritt von Ascariden in die Bauchhöhle. Auf Grund dieses Ereignisses nimmt Amberger an,

daß es so scheint, als ob auch die intakte Darmwand vom Spulwurm durchbohrt werden kann.

Ähnliche Fälle, wo es sich um durch Spulwürmer verursachte Komplikationen nach Magen-Darmoperationen handelte, werden auch von Colmers, v. Hofmeister, Hornawski und Haim, letzterer beschreibt sogar 3 Fälle, berichtet. Auch Plew kann ein Präparat anführen, wo in einer Gastroenterostomienahrt ein Spulwurm steckte.

Eine Dünndarmperforation durch einen Ascaris nach eingeklemmter Schenkelhernie hat Degenhardt bei einer 50jährigen Frau beobachtet.

Einige Tage nach der Herniotomie und der Reposition der eingeklemmten Dünndarmschlinge hat ein Ascaris die geschädigte Darmwand im Bereich der Schnürfurche perforiert und ist in die freie Bauchhöhle durchgewandert, wo er eine zum Exitus führende Peritonitis herbeiführte. Ueberraschend war in diesem Falle der Sektionsbefund, wo außer dem lebenden Ascaris im freien Abdomen keine weiteren Ascariden mehr gefunden wurden.

Im Anschluß an diesen Fall sagt Degenhardt: „Ich glaube mit Sicherheit annehmen zu können, daß der Spulwurm an dem unglücklichen Ausgange des Falles die Schuld trägt. Die Darmschlinge hatte sich — wie sich bei der zweiten Operation herausstellte — gut erholt, sodaß wohl eine nachträgliche Perforation durch Gangrän auszuschließen ist. Der Ascaris hat zweifellos die Darmwand perforiert, indem er sich die durch die Einklemmung geschädigte Wandung als locus minoris resistentiae zu seinem Durchbruch ausfuchte.“

Zwei ähnliche Fälle, wo es sich gleichfalls um eine Darmperforation nach eingeklemmten Hernien handelte, hat Hornawski berichtet. Einige Tage nach der Operation befanden sich die Patienten ganz wohl, bis sie plötzlich wieder erkrankten und an diffuser Peritonitis starben. Bei dem einen Fall fand Hornawski an der Perforationsstelle am Dünndarm eine kleine Wunde mit stark infiltrierten Rändern. In beiden Fällen glaubt er mit gutem Recht annehmen zu können, daß die Ascariden die Perforation verursachten.

Von größerer Wichtigkeit in der Beurteilung der Darmperforation durch die Ascariden sind natürlich die Fälle, wo es sich zunächst um keine pathologischen

Darmwandveränderungen handelte, sondern diese erst von den Spulwürmern selbst hervorgerufen wurden.

Zieht man zunächst einmal die rein mechanischen Wirkungen, die frei bewegliche Schmarotzer von so beträchtlicher Körpergröße wie die Ascariden im Darne des Wirtes ausüben können, in Betracht, so ist es ohne weiteres verständlich, daß schon durch länger dauernde Berührung eines körperfremden Objektes mit der Darmwand bis zur Nekrose fortschreitende lokale Epithelschädigungen vorkommen können. Dies umsomehr, wenn man an die in der Literatur beschriebenen Fälle denkt, wo große Mengen solcher Parasiten entfernt wurden. So berichtet Seiffert über einen Fall, demzufolge ein Knabe in einem Tage 600 Ascariden und innerhalb von 3 Jahren 5126 Würmer entleerte.

Ueber diese Darmepithelschädigungen durch die Ascariden gibt die Kasuistik der Literatur die beste und umfassendste Auskunft.

Nach den Untersuchungen von Leukart stehen die Zahnleisten der Ascariden auf dem am meisten hervorragenden Rande der Lippen und müssen bei jeder Verschiebung auf die Darmschleimhaut einwirken können, sobald dieselbe mit dem andrängenden Kopf in unmittelbarer Berührung ist. Den Beweis dafür hat er in den Geschwürsflächen des mit Spulwürmern besetzten Hundedarmes zu sehen geglaubt, bei denen die Ulcerationen auf keine andere Art entstanden sein konnten. Auf Grund dieser Beobachtungen hält es Leukart für ungerechtfertigt, jede Beteiligung an der Perforation des Darmes den Parasiten abzusprechen. Auch Schaal hält es für wahrscheinlich, daß kleinste Schädigungen der Darmwand durch die 4 bezähnten Lippen des Ascaris vorkommen. Eine Perforation dagegen verneint er, da nach seiner Meinung die in der Peritonealhöhle gefundenen Würmer nur durch schon vorhandene Löcher geschlüpft seien.

Auch nach Aschoff kann eine oberflächliche Läsion der Schleimhaut durch das Benagen der Darmwand hervorgerufen werden, aber auch eine Enteritis mit katarrhalischen Geschwüren kann nach ihm durch die Ascariden entstehen.

Nach Flury kommen gleichfalls Epithelschädigungen bis zur Nekrose durch den Reiz des körperfremden Objektes zustande. Auch durch das Kapillargift der

Leibeshöhlenflüssigkeit der Ascariden ist eine Schädigung der Darmwand denkbar.

Daß derartige Schädigungen der Schleimhaut garnicht so selten sind, darüber berichtet P o p o w s k i, der unter 20 mit *Ascaris* infizierten Fällen sogar 15 mal die Benzidin- und Phenolphthaleinreaktion auf okkultes Blut im Stuhl positiv fand. Anämien, wie sie schon lange beim *Botriocephalus* bekannt sind, hat C o h n r e i c h auch beim *Ascaris* gesehen.

Außerst charakteristische Darmwandveränderungen durch *Ascaris* hat auch S c h l o e ß m a n n, wie er sie nach einer Appendektomie beobachtet hat, mitgeteilt.

Es handelte sich um ein dreijähriges Mädchen, das mit der Diagnose Appendicitis chronica in die Klinik eingeliefert wurde. Bei der Operation zeigte sich der Wurmfortsatz als ein ungewöhnlich langes, starr eregiertes Gebilde, das sich in eigentümlicher Weise etwa 6 bis 7 cm weit reliefartig in die Coecalwand hinein fortsetzte. Die Serosa war stark injiziert und glanzlos. Plötzlich begann sich nun der steife Appendix in grotesker Weise zu bewegen und es wurde nun deutlich, daß ein Spulwurm zu zwei Drittel seiner Länge sich in dem Wurmfortsatz befand. Der Wurm führte so gewaltige bohrende Bewegungen gegen die Appendixspitze aus, daß der Wurmfortsatz zuweilen über die Hälfte seiner normalen Länge ausgestreckt wurde. Nach der Appendektomie wurde der Wurmfortsatz mikroskopisch untersucht und es fand sich folgendes Ergebnis.

Am proximalen, makroskopisch am wenigsten veränderten Appendixviertel annähernd normale Verhältnisse. Vereinzelte kleine Blutungen in der Follikelschicht der Submucosa, meist in unmittelbarer Umgebung eines Lymphfollikels. Stellenweise beginnende Leucocyteninfiltration der Schleimhaut, An stärker veränderten Stellen, die weiter distalwärts folgen, das Schleimhautepithel noch gut erhalten, die Zellinfiltration in Submucosa und Mucosa nimmt rasch zu und zwischen den infiltrierten Gebilden breiten sich ausgedehntere Hämorrhagien aus. Sie reichen in der Mucosa bis an die Epithelschicht heran, breiten sich aber mit einer gewissen Vorliebe an der Grenze zwischen Submucosa und Ringmuskulatur aus. Die Muscularis mucosae ist stellenweise durch Infiltration und Blutung unsichtbar geworden. Besonders bemerkenswert ist das Verhalten der Muskulatur der

Wurmfortsatzwand. An keiner einzigen Stelle ist die entzündliche Leucocyteninfiltration oder die diffuse Blutung in die Muscularis vorgedrungen. Noch weiter distalwärts erscheinen mehr und mehr Blutaustritte in der Darmlichtung, anfangs nur in dünner Schicht den Epithelien aufgelagert, dann reichlicher dem Darminhalt beigemischt. An den Stellen der größten Veränderung des Organes ist zwischen dichter Leucocyteninfiltration der Mucosa und Submucosa großartige blutige Durchtränkung beider Gewebsschichten festzustellen. In der Submucosa nimmt sie besonders die Form größerer Blutergüsse in das Gewebe an. Hier sieht man auch beginnende Schleimhautnekrose und Epitheldefekte. Ganz allein die Muskelschichten sind auch hier von all diesen Entzündungserrscheinungen unberührt.

In der Beurteilung des histologischen Befundes hebt Schloßmann neben dem Stadium phlegmonös-eitriger Entzündung besonders die außergewöhnlichen profusen Blutungen und das völlige Freisein der Muskelschichten von Entzündung und Blutung hervor. Eine traumatisch entstandene Schädigung während der Operation ist vorsätzlich vermieden worden, sodaß als Ursache der Extravasate nur der Ascaris in Frage kommen kann, wobei die verstärkte Peristaltik bei dem Versuch sich von dem Fremdkörper zu befreien und das Andrängen des Spulwurms anzuschuldigen sind. Durch diese gegenseitigen Einwirkungen ist daher auch eine Epithelschädigung und die Bildung eines Primäraffektes, von dem aus sich der weitere Verlauf entwickelte, leicht zu verstehen.

Auch H u b e r berichtet über einen Fall von Darmläsion durch Ascariden. Bei einer Patientin, die öfter an Schmerzen im Epigastrium, Koliken und leichte Diarrhoen geklagt hatte und durch Diphtherie ad exitum gekommen war, fanden sich bei der Sektion im Darm etwa 20 Spulwürmer und im Ileum eine etwa 3 Zoll lange Strecke der Schleimhaut mit stark blutig tingiertem Sekret bedeckt, während die Schleimhaut selbst mit zahllosen, stechnadelkopfgroßen bis linsengroßen Ecchymosen bedeckt war.

An diesen Fall schließen sich auch die Beobachtungen L e r o u x s an, der bei der Obduktion eines jungen Mannes auf der Innenfläche des mit mehr als 100 Spulwürmern besetzten Darmes zahlreiche kleinere Blutpunkte, „Stichwunden“, wie er sagt, fand, „die von einem kleinen roten Hof umgeben waren“.

Hoffmann teilt etwas Ähnliches in seinen Beobachtungen mit, daß nämlich der Darm dort, wo der Spulwurm gelegen hatte, entweder sich die Schleimhaut gerötet und gelockert fand, oder auch an solchen Stellen richtige Geschwüre beobachtet werden konnten.

Gleichfalls mechanische Schleimhautschädigung beschreibt Gerlach, der in einem Sektionsfalle von diffuser Peritonitis nach spastischem Ileus durch Ascariden im Dünndarm längsverlaufende Schleimhautdefekte als Folgen einer mechanischen Schädigung der Schleimhaut fand. Nach seiner Meinung beweist dieser Fall, daß bei dem Vorhandensein zahlreicher Ascariden im Dünndarm auch dort mechanische Schädigungen der Schleimhaut möglich sind, wie sie Schloßmann für den Wurmfortsatz beschrieben hat. Die Vorstellung über den Schädigungsmechanismus läßt er dahingestellt sein, doch hält er es für das Wahrscheinlichste, daß die rinnenförmigen Verletzungen der Schleimhaut dann zustande kommen, wenn bei größerer Wurmansammlung an einer Darmstelle die Tiere sich lösen und vorwärts zu dringen versuchen. Die makroskopisch betrachteten Rinnen der Dünndarmschleimhaut machten ganz den Eindruck einer mechanischen Schädigung; beweitend war jedoch der histologische Befund; denn hätte es sich um toxische Schädigungen gehandelt, so hätte die Schädigung mehr eine flächenhafte sein müssen. Dies war aber nicht der Fall, sondern zu beiden Seiten des bis in die Submucosa reichenden Defektes fand sich gesunde Schleimhaut.

Ueber eine durch Spulwürmer hervorgerufene Schleimhautnekrose berichtet Takeuchi, der bei der Sektion eines 5 $\frac{1}{2}$ jährigen Knaben, der an den Erscheinungen einer Peritonitis und einer Peliosis rheumatica gestorben war, eine Perforation des Darmes im Bereiche eigenartiger, massiger und umschriebener Nekrosen im Bereich stärkerer Ansammlungen von Ascariden fand. Mikroskopisch fand er bei dem Fall eine scharf abgesetzte Nekrose der Darmwand.

Auch Darmwandgeschwüre haben als Urheber Ascariden gehabt. So berichtet Maillard über einen Fall bei einem Soldaten, wo dieser unter Fieber und akuter Peritonitis erkrankte, daß sich bei der Autopsie am Dickdarm 5 Geschwüre fanden, die nur noch von Serosa bedeckt waren. Außerdem wurden noch 15 Spulwürmer in diesem Darmabschnitt gefunden. Er hält es ganz

außer Zweifel, daß diese Ulcerationen von den Ascariden hervorgerufen wurden.

Auch die Untersuchungen Spieths an auffallend geröteten Darmwandstellen lassen es sicher erscheinen, daß an den Anlagerungsstellen der Ascaridenknäuel Nekrosen der Schleimhaut auftreten.

Ueber den seltenen Fall einer Anheftung eines Spulwurms an die Darmwand hat Schultze berichtet, der bei der Sektion eines 11jährigen Mädchens im Dünndarm einen männlichen Ascaris fand, dessen Kopfende gänzlich in der Darmmucosa steckte. Daß die Lagerung schon intra vitam angenommen war, darauf wiesen Abplattungserscheinungen in der Umgebung des Sitzes des Wurmes hin.

Fälle, in denen nun ein direktes Durchwandern der Ascariden durch die Darmwand und nicht nur eine Schädigung derselben hervorgerufen wurde, sind in der Literatur nur in geringer Anzahl zu finden.

Der Fall von Freudenthal, bei dem wegen Appendicitis chronica operiert und dann ein ausgewachsener Spulwurm in Netz eingebettet gefunden wurde, ist nicht ganz eindeutig, da keinerlei Perforation nachweisbar war. Nach der Lage der Umstände mußte sich der Parasit schon seit 6 Monaten an Ort und Stelle befinden, sodaß Freudenthal annahm, daß sich der Ascaris aus seiner Larve in der freien Bauchhöhle entwickelt habe.

Ähnliche früher beobachtete Fälle ließen v. Siebold auf den Gedanken kommen, daß die Ascariden die Darmwand durchbohren könnten, ohne eine Narbe oder sonstige Folgen zu hinterlassen. Er ging von der Vorstellung aus, daß die Spulwürmer durch bloßes Andrücken des Kopfes die einzelnen Darmwandschichten auseinanderdrängen und so in die Bauchhöhle einzutreten vermögen. Nach dem Durchschlüpfen sollte sich die Oeffnung wegen der Kontraktilität der Darmwandung, ohne Spuren zu hinterlassen, wieder schließen. Dem läßt sich jedoch mit Recht als völlig haltlos entgegensetzen, daß es ganz undenkbar ist, daß ein so großer Parasit auf jene Weise die Darmwand durchsetzen kann.

Die Frage, ob der Ascaris den lebenden ungeschädigten Darm zu durchbohren vermag, glaubt Gilberti an Hand eines selbst beobachteten Falles bejahen zu können.

Bei der Autopsie eines 7jährigen Mädchens, das an akuter Peritonitis zugrunde ging, fand sich nämlich zwischen zwei verklebten Darmschlingen eine durch doppelte Perforation entstandene spontane Anastomose mit mehreren Ascariden. Im Bereich der Perforation war keinerlei entzündliche Reaktion zu finden. Gilberti hält eine Darmperforation tatsächlich für möglich und zwar nicht nur indirekt, indem dort, wo der Wurm sich festsaugt, ein Ulcus entsteht, welches durch Infektion zur Zerstörung der Darmwand führt, sondern möglicherweise auch direkt.

Die gleiche Ansicht vertritt auch Maillard auf Grund folgenden Falles.

Ein junger Soldat starb unter Fieber und den Erscheinungen akuter Bauchfellentzündung. Die Autopsie ergab eine eitrige Bauchfellentzündung, hervorgerufen durch eine linsengroße Darmperforation. In der Peritonealhöhle fanden sich von Eiter umspült 5 Spulwürmer von 15 bis 20 cm Länge. Am Dickdarm wurden 5 Geschwüre gefunden, welche nur noch von Serosa bedeckt waren; außerdem im Dickdarm noch 15 Spulwürmer.

Ueber einen Fall von Darmperforation mit Vernarbung berichtet Nacken bei einem Operationsfall von Pyosalpinx dextra. Bei der Laparotomie zeigte es sich, daß die rechte, prallgefüllte, geschlängelte Tube mit ihrem freien Ende in etwa fingerkuppengroßer Ausdehnung mit einer Ileumschlinge verwachsen war. Bei der scharfen Durchtrennung der Verwachsungen fand sich am Ileum eine stecknadelkopfgroße vernarbte Perforationsstelle. Aus der Tube traten einige Tropfen dicken Eiters heraus, und das Ende eines Ascaris wurde sichtbar. Mit Leichtigkeit ließ sich ein 25 cm langer abgestorbener Wurm aus der Tube entfernen. Nach der Tubenexstirpation Heilung.

Ein anderer Fall, von Plew berichtet, ergibt ebenfalls eine Wurmperforation des gefunden Darmes. Bei einem 3jährigen Kinde war Typhus als Todesursache angenommen worden. Bei der Sektion ergab sich kein Anhaltspunkt für Typhus, sondern es handelte sich um eine Peritonitis mit 3 Liter eitrigem Exsudat. Im linken Hypochondrium lag ein ausgewachsener Ascaris lumbricoides, ferner fanden sich in der Darmwand eine größere und zwei kleinere schlitzzartige Perforationsöffnungen. Im übrigen Darme fanden sich keine krankhaften Pro-

zesse, die mesenterialen Lymphdrüsen waren kaum etwas vergrößert.

Auch Hürzeler erwähnt einen Fall mit letal verlaufender Darmperforation nach einem Trauma bei subakutem Ileus durch Ascaridenknäuel, welche an der Darmwand starke Veränderungen bis zur drohenden Perforation hervorgerufen hatten. Dann traf das 6jährige Kind durch das Fallen eines Faßdeckels auf den Leib eine heftige stumpfe Gewalt, die die drohende Perforation zur Wirklichkeit machte. Hürzeler betont bei der Beschreibung dieses Falles ausdrücklich, daß er insofern bemerkenswert sei, als er auch schon früher gemachte Beobachtungen bestätigen kann, vor allem die, daß die Anwesenheit von Ascariden im Darne die tiefgreifendsten Veränderungen der Darmwand hervorrufen kann, unter Umständen bis zur Perforation. Denn diese wäre in diesem Falle, wie der Sektionsbefund zeigte, auch ohne das Trauma in kurzer Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit eingetreten.

Apostolides glaubt aus zwei Fällen, die er in kurzer Zeit zu beobachten Gelegenheit hatte, und die beide an seriös eitriger Peritonitis wegen Darmperforation zugrunde gingen, schließen zu können, daß die Ascariden auch den normalen Darm durchwandern können. In einem Falle wurde in der Nähe des Nabels der Kopf eines Ascaris entdeckt und die linsengroße Perforation am sonst gefunden Darm befand sich an der Grenze von Jejunum und Ileum. Im anderen Falle war die Peritonitis durch eine im Colon ascendens befindliche linsengroße Perforation entstanden. In der Nähe der Oeffnung lag der eine Teil des Ascaris, der Rest des Wurmes fand sich im Darne.

Bei einem Patienten, der wegen Appendicitis operiert wurde, fand Page bei der Incision der Bauchdecken zahlreiche in Hohlräumen liegende Ascariden. Da angenommen wurde, daß möglicherweise das Intestinum verletzt sei, wurde die Operation rasch beendet. Diese Befürchtung bewahrheitete sich jedoch nicht, da mittels Hämatoxilin keine Fäkalfistel nachweisbar war. Aus der Bauchwunde konnten noch nach mehreren Tagen nach der Operation Ascariden extrahiert werden. Nach der Auffassung von Page hat hier zweifellos eine Durchbohrung der Darmwand stattgefunden, die später heilte. Da die frühere Perforationsstelle in der Nähe der

Operationswunde lag, so konnten die Würmer an dieser Stelle auswandern.

Nach einer schwierigen Ovariectomie beobachtete Hornawski einige Tage nach der Operation, nach der die Patientin sich ganz wohl gefühlt hatte, eine starke diffuse Peritonitis. Die Sektion ergab, daß sich ein Spulwurm in der freien Bauchhöhle befand, während ein zweiter in der Darmwand steckte, sodaß der Vorder- teil in die freie Bauchhöhle hineinragte, die andere Hälfte noch im Darne lag.

Auch Gerlach, Kehl und Brüning halten teils nach eigenen, teils nach veröffentlichten Fällen eine Durchwanderung des gefunden Darmes durch Ascariden für möglich.

Diese Fälle aus der Literatur ergänzt ein Fall aus der hiesigen Frauenklinik.

Es handelte sich um eine 31 jährige Schlossersfrau, die zur Entbindung und Sterilisation die Frauenklinik aufsuchte. Auf Befragen gab die Frau an, daß sie als Kind an Rachitis erkrankt gewesen sei und darum auch erst mit 18 Monaten das Laufen gelernt habe. Späterhin habe sie dann noch die Maßern gehabt, sonst sei sie immer gesund gewesen.

Der Eintritt der Regel sei mit 14 Jahren erfolgt, die Periode sei dann immer regelmäßig alle 4 Wochen gewesen und habe immer 3 bis 6 Tage bei mäßiger Stärke angehalten. Als Zeitpunkt der letzten Regel wird von der Frau der 20. 9. 27. angegeben.

Ferner läßt sich erfahren, daß die Frau im Jahre 1920 und 1922 durch Kaiserschnitt entbunden worden war. Im Jahre 1923 ist eine Frühgeburt im 7. Monat eingeleitet worden und in den Jahren 1924, 1925 und 1927 sei je ein Abgang im 2. Monat eingetreten.

Die Familienanamnese der Frau ergibt keine Besonderheiten.

B e f u n d :

Gracile Frau in mäßigem Ernährungszustand.

Haut und sichtbare Schleimhäute sind gut durchblutet, die Muskulatur ist wenig entwickelt, die großen hängenden Brüste enthalten reichlich Colostrum.

Die Kopforgane zeigen keine Besonderheiten.

Herz und Lunge lassen keine Veränderungen erkennen

Der Leib ist weich, nirgends druckempfindlich.

Die Schwangerschaft befindet sich in der 40. Woche, das große lebende Kind in 1. Schädellage.

Die Beckenmaße der Frau ergeben ein rachitisch-plattes Becken die Conj. vera beträgt 10,5 cm.

An beiden Beinen finden sich mäßige Oedeme und Varizen.

Harnbeschaffenheit ohne Eiweiß und path. Bestandteile.

Puls und Temperatur zeigen normales Verhalten.

Am 1. 7. 28. wird zur Entbindung ein transperitonealer Kaiserschnitt und zwecks Sterilisation eine Tubenknötung in typischer Weise ausgeführt. Eine Revision der Bauchorgane ergibt keine path. Besonderheiten.

Der Eingriff, der ein großes lebendes Kind ergibt wird von der Frau gut überstanden. Nach der Operation zeigen Puls und Temperatur normales Verhalten.

2. 7.

Das subjektive Befinden der Frau ist gut, jedoch ist die rektal gemessene Temperatur bis 38° erhöht. Die Herzaktion ist etwas beschleunigt, an Lunge und Abdomen ist kein abnormer Befund zu erheben. Zur Förderung des Stuhlganges erhält die Frau 2 Eßlöffel Rizinusöl.

3. 7.

Auch heute ist trotz der auf 38,5° erhöhten Temperatur und der entsprechenden Pulsbeschleunigung das subjektive Befinden der Frau gut. An den Lungen sind keine Schallunterschiede und Geräusche festzustellen. Das Abdomen ist leicht meteoristisch aufgetrieben, jedoch weich und nirgends druckempfindlich. Der Stuhl ist angehalten, doch entleert er sich auf Einlauf.

4. 7.

Frau klagt über häufiges stärkeres Erbrechen. Temperatur und Puls sind wie am Vortage erhöht. Das Abdomen ist stärker aufgetrieben und bei Palpation macht sich leichte Bauchdeckenspannung bemerkbar. Da Stuhl- und Windverhaltung besteht, so wird ein hoher Einlauf versucht, der jedoch ergebnislos verläuft.

Wegen der ileusartigen Erscheinungen wird das Anlegen eines Anus praeter beschlossen.

In Aethernarkose Fascienschnitt links unten. Nach Eröffnung des Peritoneums sieht man den Darm stark

gebläht, die Darmserosa ist überall glänzend. In der Bauchhöhle unten findet man etwas blutige seröse Flüssigkeit, deren Provenienz zunächst ganz unklar ist. Beim Vorziehen des Darmes — unterster Abschnitt des Dünndarmes — zeigen sich einige Darmschlingen verklebt. Bei Lösung dieser Verklebungen sieht man an dieser Stelle einen Spulwurm etwa 3 bis 4 cm aus einer Perforationsstelle der sonst gefunden Darmwand herausragen. Beim Herausziehen dieser Dünndarmschlinge gleitet der Wurm ganz heraus und es tritt etwas Darminhalt aus. Anlegen eines Anus praeter naturalis in typischer Weise.

Nach der Operation erholt sich die Frau gut. Es geht jetzt auch spontan Stuhl ab. Am Abend jedoch zeigt der Puls wechselndes Verhalten, und die Temperatur steigt auf 39,8°.

5. 7.

Gegenüber dem Vortag geht es der Frau subjektiv besser, obgleich sich der Puls immermehr verschlechtert. Die Temperatur bleibt auf gleicher Höhe. Ein pathologischer Lungenbefund ist nicht zu erheben. Der Stuhl-
abgang aus dem Mastdarm sistiert, aus dem Anus praeter gehen 2 Spulwürmer neben etwas Stuhl ab. Am Abend wird die Herzkraft wieder etwas besser, auch nimmt die Pulsfrequenz ab.

6. 7.

Die Patientin sieht heute sehr schlecht aus. Die Herzkraft nimmt dauernd ab. Trotz entsprechender Therapie erfolgt unter zunehmender Herzschwäche um 10 Uhr der Exitus.

Ein Sektionsbefund ist leider nicht zu erhalten, da die Autopsie verweigert wurde.

Nach dem Befund handelte es sich um eine Perforation des gefunden Darmes durch einen Ascaris mit nachfolgender Peritonitis. Daß der Darm nicht schon vorher durch irgendwelche entzündliche oder degenerative Prozesse geschädigt war, ergibt sich aus der Tatsache, daß die 3 Tage vor der Perforation vorgenommene Revision der Baueingeweide keinen derartigen Anhaltspunkt ergab.

Verschiedene Anschauungen lassen sich also, wie wir an den Fällen aus der Literatur gesehen haben, über die Perforation der gefunden Darmwand durch Ascariden unterscheiden.

Die eine bestreitet überhaupt jede Aktivität der Spulwürmer in Bezug auf die Darmwand, und diese Lehre hat jetzt noch viele Anhänger.

Eine andere Anschauung der Autoren glaubt den Ascariden schon die Fähigkeit, den Darm zu perforieren, nicht absprechen zu können, doch bedürfe es hier einer krankhaften Schädigung der Darmwand, die es den Ascariden ermögliche, eine Perforation zu vollenden. Neben dieser indirekten Wirkung der Schmarotzer halten sie es jedoch auch für denkbar, daß, wie die Arbeit von Flury es ergeben hat, eine chemische Komponente nicht zu übersehen sei, die durch lokale Reizung und dadurch entstehenden Gewebszerfall und Geschwürsbildung neben der mechanischen Wirkung der Tiere eine Gelegenheit zur Vollendung der Perforation gäbe.

Die letzte Gruppe jedoch glaubt, daß auch ohne *locus minoris resistentiae* es zu einer Durchbohrung der Schleimhaut und damit des Darmes kommen könne. Die Ascariden seien vielmehr imstande, durch länger dauernden einfachen Druck — wie es der Umstand beweist, daß Fremdkörper auf diese Weise den Darm durchwandern können — durch bohrende Bewegungen, sowie durch direktes Benagen der Darmmucosa eine Läsion sämtlicher Schichten herbeiführen zu können. Für letztere Möglichkeit spricht ja auch der Fall von Schloßmann, wo ein *Ascaris* mit großer Gewalt gegen die Darmwand andrängte.

Zu einer endgültigen Lösung der Perforationsfrage der gesunden Darmwand durch die Ascariden ist es trotzdem noch nicht gekommen. Jedoch ist auf Grund der vorliegenden Fälle aus der Literatur und des eigenen beobachteten Falles bei Ascarideninfektion die Möglichkeit einer Perforation der gesunden Darmwand erwiesen. Eine durch die Operation hervorgerufene Ruhe in der Darmperistaltik mag genügen, um die Perforation zu ermöglichen.

Zum Schlusse dieser Arbeit ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Prof. Dr. E. Zweifel für die Ueberlassung von Thema und Material und Herrn Geheimrat Prof. Dr. A. Döderlein für die Uebernahme des Referates meinen ganz ergebenen Dank auszusprechen.

Literatur.

- Amberger Ein Fall von Ascaridenobturationsileus mit mehrfacher sekundärer Darmperforation.
Münchener med. Wochenschr. 1924. S. 74.
- Apostolides Two cases of perforation of the intestine by ascarides.
Lancet 1898. 7. Mai. S. 1254.
- Aschoff Pathologische Anatomie. IV. Auflage. 1919.
Band I. S. 300. Band II. S. 919.
- Braun-Seiffert Die tierischen Parasiten des Menschen. 1920. S. 335.
- Brüning Die kindlichen Darmschmarotzer, ihre Störungen und ihre Behandlung.
Deutsche med. Wochenschrift. 1916: No. 23.
- Capitolin Ascaridische Peritonitiden.
Spitalul No. 8. S. 216. 1920.
- Cohnreich Ueber Eingeweidewürmer.
Medizinisches Korrespondenzblatt des Württembergischen ärztlichen Landesvereins. 1917. Bl. 87.
- Colmers Magennahtinsuffizienz durch einen Spulwurm.
Zentralblatt für Chirurgie. 1923. Nr. 48/49.
- Degenhardt Perforation des Dünndarms durch einen Ascaris nach eingeklemmter Hernie.
Zentralblatt für Chirurgie. 1924. No. 31.
- Flury Zur Chemie und Toxikologie der Ascariden.
Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. 1912. Bd. 65. H. 4/5.
- Freudenthal Bemerkenswerter Fall eines Ascaris lumbricoides in der freien Bauchhöhle.
Medizinische Klinik. 1923. H. 15.
- Gerlach Ueber mechanische Schleimhaut-Schädigungen durch Ascariden bei Ascaridenileus.
Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 1922. Bd. 173.
- Gilberti Intestinale Perforation durch Ascaris lumbricoides.
Zentralblatt für Chirurgie. 1921. No. 35.
(Policlinico 27. Fasc. 5. 1920.)

- Haim Ueber durch Spulwürmer verursachte Komplikationen nach Magen-Darmoperationen. Zentralblatt für Chirurgie. 1924. No. 15.
- Hoffmann zitiert bei Sehrt.
- v. Hofmeister Ueber chirurgische Ascaridenerkrankung. Zentralblatt für Chirurgie. 1913. No. 30.
- Hornawski Ueber die Möglichkeit von Perforation des Darmes durch *Ascaris lumbricoides*. Zentralblatt für Chirurgie. 1907. No. 2.
- Huber zitiert bei Flury.
- Huber Reizwirkung von *Ascaris* am Darms des lebenden Menschen beobachtet. Münchener med. Wochenschrift. 1912. No. 49. S. 2669.
- Hürzeler Chirurgische Ascaridenerkrankungen. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 1923. Bd. 178,
- Jaroschka Fall von Dünndarmperforation durch Ascariden an einer Serosanastomose bei einem Fall von Ascariden-obturationsileus. Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. 1923. Bd. 178.
- Kartal Durch *Ascaris* vorgetäuschte intraperitoneale Blutung. Zentralblatt für Chirurgie. 1924. H. 6.
- Kauffmann Lehrbuch der speziellen pathologischen Anatomie. 1909. S. 526.
- Kehl Die durch tierische Parasiten hervorgerufenen chirurgischen Erkrankungen der Bauchhöhle. Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten. 1922. Bd. 8. H. 3.
- Leroux zitiert bei Sehrt.
- Leukart Die menschlichen Parasiten. 1876. Bd. II.
- Maillard Lombricose et perforation intestinale. Arch. de méd. et de pharm. milit. 1911.
- Nacken *Ascaris lumbricoides* in der Tube. Zentralblatt für Gynäkologie. 1920. No. 14.
- Page Migration of helminths. New York med. journ. 1906. Jan. 20.
- Plew Ueber die Perforation des Darmes durch Ascariden. Archiv für Kinderheilkunde. 1913. Bd. 62. H. 1/2.
- Popowski Ueber den Blutbefund in den Faeces bei *Trichocephalus dispar* und anderen Scharotzern. Münchener med. Wochenschrift. 1921. S. 45.
- Roft Experimentelles und klinisches über Ascaridenileus. Münchener med. Wochenschrift. 1919. S. 1066 u. 1453.
- Schaal Fall von ausgesprochenen peritonitischen Erscheinungen bei *Ascaris lumbricoides*. Münchener med. Wochenschrift. 1912. S. 2619.
- Schloßmann Ueber chirurgische Erkrankungen durch Ascariden. Beiträge zur klinischen Chirurgie. 1914. H. 3.

- Schultze zitiert bei Sehrt.
- Sehrt Ueber Ascaridenerkrankungen der Bauchhöhle.
Beiträge zur klinischen Chirurgie. 1906. H. 3.
- Seiffert in Braun-Seiffert.
- v. Siebold zitiert bei Plew.
- Simon zitiert bei Flury.
- Spieth Beiträge zur Ascaridenerkrankung mit besonderer
Berücksichtigung der Frage der Giftwirkung.
Virch. Arch. 1914. Bd. 215.
- Strater Operativ geheilter Fall von Ascaridenileus.
Zentralorgan für die gesamte Chirurgie und ihre
Grenzgebiete. 1921. Bd. 24.
- Takeuchi Ueber eigenartige Darmwandnekrosen durch Ascariden.
Münchener med. Wochenschrift. 1926. S. 165.
-

Lebenslauf.

Ich, Wilhelm Hermann Hans Reinecke, bin am 18. 1. 1904 in Magdeburg als Sohn des Rektors Gustav Reinecke geboren. Ostern 1910 trat ich in die Vorschule des Gardelegener Realreformprogymnasiums ein, welches ich von Ostern 1913 bis Ostern 1919 besuchte. Ostern 1919 trat ich in das Realreformgymnasium in Schönebeck/Elbe ein, von wo ich Ostern 1923 mit dem Reifezeugnis entlassen wurde.

Das medizinische Studium begann ich im Sommersemester 1923 in Halle/Saale, und nach 5 Semestern unterzog ich mich dortselbst dem Physikum. Die 5 klinischen Semester studierte ich an der Universität München, wo ich im Sommer 1928 das medizinische Staatsexamen ablegte. Nach dem Staatsexamen war ich 4 Monate an der Universitätsfrauenklinik München als Medizinalpraktikant tätig, und seit dem 1. November 1928 befinde ich mich als Medizinalpraktikant an dem Krankenhaus des III. Ordens in München-Nymphenburg.
